



## PROFILS

**DES DECOUVERTES TARDIVES DE SEROPOSITIVITE AU VIH**

**EN 2014**

**DANS LE TERRITOIRE DU COREVIH Lyon-Vallée du Rhône**

*S. Degroot – Data-Manager COREVIH LVdR*

## Quelques précisions ....

- Etude faite sur la file active 2014 des personnes vivant avec le VIH documentée par le COREVIH LVdR.
- FA : le nombre de patients VIH ayant eu au moins 1 consultation ou 1 hospitalisation en 2014, dans 1 des 11 structures de santé rattachée au COREVIH :
  - Rhône : HCL (CR, HEH), Hôpital de Villefranche-sur-Saône , Hôpital Desgenettes, Centre de vaccinations internationales, Maison Hestia, le réseau virage santé
  - Ain : Hôpital de Bourg en Bresse
  - Drôme : Centre hospitalier de Valence
  - Ardèche : Les centres Hospitaliers d'Annonay et Aubenas
- Ces données sont issues du logiciel Nadis et sont exploitées dans le logiciel Dataids

## Quelques données concernant la FA 2014 du COREVIH LVdR

- FA : 4643 patients vivant avec le VIH.
- Sur ces 4643 patients, 200 patients ont été nouvellement dépistés (4,3% de la FA) dont 109 dépistés tardivement (CD4<350) (2,3% de la FA)

*plus de la moitié (54,5%) des découvertes de séropositivité sont tardives .*

**Notre étude va porter sur les 109 nouveaux patients VIH dépistés tardivement (CD4<350)**

# ETUDE

- Description de l'ensemble des 109 patients dépistés tardivement en 2014
  - par sexe
    - par facteur de risque

# DESCRIPTION DES 109 PATIENTS DEPISTES TARDIVEMENT EN 2014


## Sexe

Hommes	79	72,50%
Femmes	30	27,50%
Sexe Ratio	2,7	

## Age au dépistage

Moyenne	41 ans
Médiane	40 ans
Ecart-type	13 ans
Min	18 ans
Max	89 ans


## REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE



- Population très majoritairement masculine, avec une moyenne d'âge de 41 ans dont plus de la moitié (57% ) est dépistée entre 30 et 49 ans

# DESCRIPTION DES 109 PATIENTS DEPISTES TARDIVEMENT EN 2014


## REPARTITION PAR ORIGINE GEOGRAPHIQUE



- Plus de la moitié (52,3%) de ces patients sont nés à l'étranger avec 37% d'origine sub-saharienne

# DESCRIPTION DES 109 PATIENTS DEPISTES TARDIVEMENT EN 2014

## REPARTITION PAR FACTEUR DE RISQUE




- Mode de contamination essentiellement sexuel dont plus de la moitié par rapports hétérosexuels (54%) contre 39% par rapports homo/bisexuels

# DESCRIPTION DES 109 PATIENTS DEPISTES TARDIVEMENT EN 2014

## Stade

Non sida	81	73,30%
sida	28	25,70%

## Infections opportunistes




- 1/4 de ces patients sont au stade sida
- L'infection opportuniste la plus répandue étant la pneumocystose

# DESCRIPTION DES 30 FEMMES DEPISTÉES TARDIVEMENT EN 2014

- Age au dépistage

Moyenne	40,3 ans
Médiane	36 ans
Ecart-type	12,26 ans
Min	18 ans
Max	62 ans

## REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE




- Bien que la moyenne d'âge soit à plus de 40 ans, la tranche d'âge la plus importante est celle des 30-39 ans.
- Plus de la moitié (56,5%) de ces femmes sont dépistées avant 40 ans.
- A noter, 1 femme sur 5 a entre 50 et 59 ans au dépistage


# DESCRIPTION DES 30 FEMMES DEPISTÉES TARDIVEMENT

EN 2014

## REPARTITION PAR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE



## REPARTITION PAR FACTEUR DE RISQUE



## Stade

Non sida	25	83,30%
Sida	5	16,70%


- 90 % population née à l'étranger dont 80% d'origine sub-saharienne
- Le mode de contamination est exclusivement par rapports hétérosexuels
- Moins d'1/5 dépistées au stade sida

# DESCRIPTION DES 79 HOMMES DEPISTES TARDIVEMENT EN 2014

- Age au dépistage

Moyenne	41,25 ans
Médiane	40 ans
Ecart-type	13,3 ans
Min	18 ans
Max	89 ans

## REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE




- la tranche d'âge la plus importante est celle des 40-49 ans.
- Plus de la moitié (58,10%) de ces hommes sont âgés au dépistage de 30 à 49 ans


# DESCRIPTION DES 79 HOMMES DEPISTES TARDIVEMENT

EN 2014

## REPARTITION PAR ORIGINE GEOGRAPHIQUE



## REPARTITION PAR FACTEUR DE RISQUE



## Stade

Non sida	56	71%
Sida	23	29%


- Plus de 60% de ces patients sont d'origine française, 38% d'origine étrangère.
- Plus d'1/4 de ces patients sont au stade sida.
- Le mode de contamination est essentiellement par voie sexuelle avec une dominante par rapports homo/bisexuels (55%)
- A noter, 1 patient contaminé par transfusion sanguine et 1 par UDI

## DESCRIPTION DES 30 HOMMES DEPISTES TARDIVEMENT EN 2014 ET CONTAMINES PAR RAPPORTS HETEROSEXUELS

- Age au dépistage

Moyenne	44,6
Médiane	43
Ecart-type	14,33
Min	26
Max	89


### REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE



- Moyenne d'âge est à plus 44 ans, la tranche d'âge la plus importante est celle des 40-49ans. On note que 77% de cette population a entre 30 et 59 ans

# DESCRIPTION DES 30 HOMMES DEPISTES TARDIVEMENT EN 2014 ET CONTAMINES PAR RAPPORTS HETEROSEXUELS

## REPARTITION PAR ORIGINE GEOGRAPHIQUE



## Stade

Non sida	22	73,30%
Sida	8	26,70%


- Population majoritairement d'origine étrangère (57%) avec 47% de patients d'origine sub-saharienne et 43% d'origine française
- 26,70 % de cette population est dépistée au stade sida

## DESCRIPTION DES 43 HOMMES DEPISTES TARDIVEMENT EN 2014 ET CONTAMINES PAR RAPPORTS HOMO/BISEXUELS

- Age au dépistage

Moyenne	38,7
Médiane	40
Ecart-type	11,8
Min	18
Max	66


### REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE



- La moyenne d'âge est à 38,7 ans.
- La tranche d'âge la plus importante est celle des 40-49 ans, nous constatons aussi que 81,5% de cette population est dépistée avant 50 ans.

# DESCRIPTION DES 43 HOMMES DEPISTES TARDIVEMENT EN 2014 ET CONTAMINES PAR RAPPORTS HOMO/BISEXUELS

## REPARTITION PAR ORIGINE GEOGRAPHIQUE



## Stade

Non sida	31	72%
Sida	12	28%

- Population très majoritairement d'origine française
- 28% de cette population est dépistée au stade sida

## DESCRIPTION DES 2 HOMMES DEPISTES TARDIVEMENT EN 2014 ET CONTAMINES PAR TRANSFUSION ET UDI

- **Patients originaires d'Europe de l'est**
- **Le patient contaminé par UDI est âgé de 19 ans et n'est pas au stade sida**
- **Le patient contaminé par transfusion est âgé de 47 ans et dépisté au stade sida**

# CONCLUSION

## Profil de l'ensemble des découvertes tardives de séropositivité du territoire du COREVIH LVdR

- Les  $\frac{3}{4}$  sont des hommes.
- Cette population est majoritairement âgée au dépistage de 30 à 49 ans et d'origine étrangère.
- Population contaminée essentiellement par voie sexuelle avec une légère supériorité des rapports hétérosexuels.
- $\frac{1}{4}$  des patients sont dépistés au stade sida, dont l'IO largement dominante est la Pneumocystose

## Profil des 30 femmes dépistées tardivement

- plus de la moitié est dépistée avant 40 ans.
- Exclusivement contaminées par rapports hétérosexuels
- Essentiellement d'origine étrangère (90%)
- Moins d' $\frac{1}{5}$  arrivent au stade sida ( population la moins concernée par le stade sida)

# CONCLUSION

## ➤ Profil des 79 hommes dépistés tardivement

- Plus de la moitié sont dépistés entre 30 et 49 ans et d'origine française
- Essentiellement contaminés par voie sexuelle dont plus de la moitié contaminée par rapports homo/bisexuels
- Plus d'1/4 au stade sida (population la plus concernée par le stade sida)

### ○ Profil des 30 hommes dépistés tardivement contaminés par rapports hétérosexuels

- Plus des  $\frac{3}{4}$  ont entre 30 et 59 ans au dépistage et la moitié sont d'origine étrangère – A noter, 43% sont d'origine française

### ○ Profil des 43 hommes dépistés tardivement contaminés par rapports homo/bisexuels

- Environ 80 % sont dépistés avant 50 ans et sont originaires de France

**MERCI.....**