



Je prends **soin** de moi,
de ma famille, je me **protège**
avec la **PrEP**



1.

**LA PrEP
C'EST
QUOI ?**

UN TRAITEMENT CONTRE LE VIH

La PrEP me protège du VIH mais pas des infections sexuellement transmissibles.

La PrEP protège les personnes qui ne sont pas infectées par le VIH.

La PrEP n'empêche pas de tomber enceinte.





2.

**LA PrEP
C'EST POUR
QUI ?**



POUR TOUT LE MONDE

Tout le monde peut bénéficier de la PrEP selon sa situation et après en avoir discuté avec le docteur.

JE N'AI PAS D'A.M.E
OU D'ASSURANCE
MALADIE



✓ c'est OK

JE N'AI PAS
DE PAPIERS



✓ c'est OK

JE N'AI PAS
D'ARGENT



✓ c'est OK





3.

**COMMENT
PRENDRE
LA PrEP ?**



JE PEUX ME FAIRE PRESCRIRE LA PREP



CHEZ MON DOCTEUR



À L'HÔPITAL



DANS UN CENTRE
DE DÉPISTAGE OU
CENTRE DE SANTÉ



MA PREMIÈRE CONSULTATION



Le **docteur** m'explique ce qu'est **la PrEP**, les **examens à faire** et si ce traitement est **fait pour moi**.





Je peux **récupérer le traitement**
à la **pharmacie**.

ON LA PREND TOUS LES JOURS



C'est **facile**, je la
prends **tous les
jours à heure fixe**
et pendant le repas
si possible.



UN RENDEZ-VOUS TOUS LES 3 MOIS



1 rendez-vous avec mon médecin **tous les 3 mois**
pour faire un **bilan de santé** et **renouveler ma PrEP**.



4.

**POURQUOI
PRENDRE
LA PrEP ?**

La **PrEP**
m'empêche
d'attraper le VIH,
elle me protège

Avec la **PrEP** je
me **protège**, je
prends soin de
moi et de **mes**
partenaires

La **PrEP** est
efficace si elle
est bien prise

La **PrEP** me
permet d'**être**
autonome sur ma
protection VIH



5.

LA PRÉVENTION COMBINÉE

La PrEP protège uniquement du VIH, pas des autres infections sexuellement transmissibles.


Je pense aussi :




Au **préservatif** qui me **protège de toutes les autres infections sexuellement transmissibles** (VIH, Syphilis, Hépatites, Chlamydiae, Gonocoque...)



À demander un **dépistage régulier**. C'est **gratuit** et **anonyme** dans les **centres de dépistage** (CeGIDD)



Au **Traitement d'Urgence** contre le **VIH** : Le TPE est un autre **médicament** qui permet de se **protéger contre le VIH**. Il se prend **après un risque** (problème de préservatif par exemple). Il doit être pris au **plus tard 48h heures après le rapport sexuel non protégé**.



Projet initié et créé par les COREVIH Arc-Alpin, Auvergne-Loire et Lyon-Vallée du Rhône.

Conception graphique

