

Le B-A BA de la PrEP

Dr Fanny ANTHONY MOUMOUNI

Service de Prévention des Maladies Infectieuses

CH Moulins-Yzeure

GHT Clermont-Ferrand

25/06/2024

Cas clinique

- Anastasia, 36 ans, originaire d'Ukraine, en France depuis Juillet 2022
- Traductrice
- Célibataire
- Vient au CeGIDD pour éruption cutanée apparue il y a une semaine, non prurigineuse mais disgracieuse
- Aucune autre doléance
- Elle signale des relations sexuelles fréquentes, pas toujours protégées et souvent avec des partenaires « d'un soir ».

Cas clinique

- Vous avez déjà eu cette femme pour un premier dépistage il y a 6 mois où toutes les IST étaient négatives.
- A l'époque, elle vous disait être en couple stable...
- Ce jour, à l'interrogatoire, elle vous avoue être une escort-girl les week-end dans la région parisienne en plus de son travail
- Vous l'examinez



dr-karazaitri-ma.net

-
- Quelles sont vos hypothèses diagnostiques?
 - Quels sont les éléments d'ordre cliniques que vous recherchez?
 - Quel bilan biologique allez vous faire?


-
- Exanthème subit ?
 - Rubéole ?
 - Primo infection à VIH ?
 - Syphilis ?
 - Infection à Entérovirus (echovirus, coxsackie, adénovirus)?

-
- Le lendemain, votre laboratoire vous appelle:
 - Sérologie VIH, VHC négatives
 - Antécédent de vaccination pour le VHB avec un titre à 400
 - Sérologie syphilis positive en EIA et RPR positif à 1/128

Quel est votre diagnostic

Quel est votre prise en charge

Traitement de la syphilis



-
- Que lui proposeriez vous en termes de surveillance?

-
- **Contrôle des titres de VDRL à M3, M6, M12 (et plus : VIH, grossesse) = témoin de guérison ou d'évolutivité**

- **Décroissance des titres de VDRL :**

- titre/4 à 3 - 6 mois : (128 → 32 ou 32 → 8 ou 8 → 2)
- Négativation à 12-24 mois : titre < 1 ou au minimum ≤ 4 (**guérison**)


▶ **Si non décroissance du VDRL de 2 dilutions à 6 M : 3 inj de BBP**

▶ **Si titre VDRL x 4 : évolutivité ou recontamination PROBABLE**

- Le TPHA ou Elisa reste (+) dans 85% des cas (« **cicatrice sérologique** »)

-
- Au vue du contexte, vous lui parlez de la PrEP car elle serait éligible

Qu'est-ce que la PrEP?



A qui s'adresse t- elle?

Cibles:

- Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes
- Les travailleuses ou travailleurs du sexe et leurs partenaires
- Les personnes qui viennent de pays de forte endémicité VIH et leurs partenaires
- Les partenaires des PVVIH qui n'ont pas atteint une charge virale indétectable
- Les personnes qui consomment des drogues par injection (avec échange de seringue)

Contexte:

- Relations sexuelles sans préservatifs
- Partenaires multiples
- Antécédents d'IST
- Recours antérieur au TPE (traitement d'urgence)
- Consommation des substances lors de rapports sexuels (chemsex)
- **Contre-Indications:**
 - Séropositivité au VIH ou sérologie VIH inconnue
 - Symptômes évocateurs d'une primo-infection
 - Insuffisance rénale avec clairance de la créatinine < 60 ml/min

Consultation PrEP

- En CEGIDD/ centre de santé sexuelle/ médecine de ville
- Pré-requis:
 - Sérologie VIH négative (date de la dernière RS non protégée); Sérologie VHB
 - Fonction rénale normale et pas d'autres CI
 - Checker les interactions médicamenteuses
 - Voir le carnet de vaccination et compléter les vaccins si besoin
 - dTPCa, VHA, VHB, HPV, Mpox


Consultation PrEP

Bilan initial

- Sérologie VIH (6 semaines après la dernière exposition avec prise de risque)
- Créatinine sérique avec débit de filtration glomérulaire.
- Sérologie Hépatite B (Antigène HBs, Anticorps HBc, Anticorps anti HBs).
- Sérologie hépatite A (VHA),
- Sérologie hépatite C (VHC),
- Sérologie de la syphilis,
- PCR gonocoque et Chlamydia trachomatis (pharyngé, anal, urinaire ou vaginal),
- Beta HCG chez les femmes
- Transaminases (ALAT)

Modalités

- Deux façon de prises:
 - En continu 1 cp tous les jours; possible pour TOUS (et si Ag HBs positif)



Modalités


- Deux façon de prises:
 - A la demande (cf schéma), uniquement pour les hommes CIS-GENRES et ayant Ag HBs négatif



Modalités

PRISE INCOMPLÈTE

SI LE SCHÉMA INITIAL N'EST PAS COMPLET À LA DERNIÈRE PRISE, REPRENDRE AVEC 2 COMPRIMÉS



796 x 471

REPRISE D'UNE ACTIVITÉ SEXUELLE MOINS DE 7 JOURS APRÈS LE DERNIER COMPRIMÉ



1097 x 650

SUIVI PREP

M+1: sérologie VIH et Créatininémie

Trimestriel (semestriel si faible exposition) : Sérologie VIH, syphilis, PCR IST et ALAT (+ sérologie VHC si prise spécifique de risque: UDI , FIST)

Annuel: sérologies VIH, VHC, Syphilis, Créatininémie, ALAT et PCR IST

Exemples d'ordonnances

Ordonnance PrEP en continue homme cis genre

NB :

- chez l'homme cis genre, quelle que soit l'orientation sexuelle, la réalisation d'une dose de charge permet une efficacité dès le premier jour.
- schéma adapté aux VHB Ag HBs ou non immunisés

EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (fumarate) 245 mg cp

2 comprimés en une prise le 1er jour, entre 2h à 24h avant le rapport sexuel

puis 1 comprimé par jour pendant 30 jours, renouvelable 2 fois

PRESERVATIFS

1 boîte de 24, renouvelable 2 fois

Ordonnance PrEP en discontinue homme cis genre (hors AMM)

NB :

- PrEP à la demande uniquement chez homme cis
- non adapté chez femmes cis ni chez les femmes trans
- Ce schéma ne doit pas être utilisé chez les personnes porteuses chroniques de virus de l'hépatite B

EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (fumarate) 245 mg cp

2 comprimés en une prise entre 2h et 24h avant le rapport sexuel

puis 1 comprimé 24h (+/- 2h) après la 1ère prise,

puis 1 comprimé 24h (+/- 2h) après la 2ème prise.

En cas de rapports répétés, poursuivre avec 1 comprimé par jour jusqu'à 2 jours après le dernier rapport sexuel

PRESERVATIFS 1 boîte de 24 renouvelable 2 fois

Ordonnance PrEP femme cis et trans genre

NB : penser à la contraception si souhaitée

EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (fumarate) 245 mg cp

1 comprimé par jour tous les jours pendant 30 jours, en mangeant.

Un délai de 7 jours de prise est recommandé avant le premier rapport sexuel à protéger pour que la PrEP soit considérée comme efficace.

Pour arrêter la PrEP : continuer à prendre 1 comprimé par jour pendant les 7 jours qui suivent le dernier rapport sexuel avant d'interrompre la PrEP.

PRESERVATIFS

1 boîte de 24 renouvelable 2 fois

Répertoire des lieux de prescription et d'information sur la région Auvergne-Loire

CH de MONTLUÇON
18 Avenue du 8 Mai 1945
04 70 02 42 79

CeGIDD de MONTLUÇON
16 rue Hector Berlioz
04 70 03 89 77

CH de MOULINS
10 Avenue du Général de Gaulle
04 70 20 88 00

CeGIDD de MOULINS
10 Avenue du Général de Gaulle
04 70 20 88 00

CHU de CLERMONT-FERRAND
58 rue Montalembert
04 73 75 49 31

Service de Santé Universitaire
25 rue Etienne Dolet
63000 Clermont-Fd
04 73 34 97 20

CeGIDD de CLERMONT-FERRAND
Dispensaire Emile Roux
11 rue Vaucanson
04 73 14 50 80

Association AIDE
9 rue de la Bouché
63000 Clermont-Fd
04 73 99 01 01

CH d'AURILLAC
50, avenue de la République
04 71 46 56 56

CeGIDD 15
50 avenue de la République
04 71 46 82 45

Antenne CeGIDD de SAINT-FLOUR
2 avenue du Docteur Mallet
04 71 60 64 72

Antenne CeGIDD de BRIOUDE
2 rue Michel de l'Hospital
04 71 50 98 00

CH de VICHY
Boulevard Deniere
04 70 97 33 23

Antenne CeGIDD de VICHY
Boulevard Deniere
04 70 97 33 23

CH de ROANNE
28 rue de Charlieu
04 77 44 30 74

CDAG de ROANNE
28 rue Charlieu
04 77 44 30 73

Planning familial de Monistrol-sur-Loire
Maison de Brunelles
12 avenue Charles de Gaulle
04 71 66 07 43

CH du PUY EN VELAY
12 Bd du Docteur Chanlemesse
04 71 05 66 90

CeGIDD du PUY EN VELAY
12 Bd du Docteur Chanlemesse
04 71 05 66 90

CHU de ST-ETIENNE
Hôpital Nord
Avenue Albert Raimond
42270 St-Priest en Jarez
04 77 12 77 89

CeGIDD de ST-ETIENNE
14 rue de la Charité
04 77 12 74 75


CeGIDD de ST-ETIENNE
Hôpital Nord - Bâtiment A
Avenue Albert Raimond
42270 St-Priest en Jarez
04 77 12 07 63

PLANNING FAMILIAL de ST ETIENNE
16 rue Polignais
42000 ST ETIENNE
04 77 25 24 91

Association ACTIS
15 rue de la résistance
42000 ST-ETIENNE
04 77 41 66 99

Lieux de prescription de la PreP
et de suivi d'une infection VIH
confirmée

Où faire un dépistage du VIH et
des IST ?



MERCI