

A vos marques ...

PrEP

Partez !





SOMMAIRE

Un peu d'histoire
Prévention diversifiée

Pour qui ?
Comment ?
Suivi ?

Liens utiles

Un peu d'histoire

**JANVIER
2016**

**MARS
2017**

**SEPTEMBRE
2017**

**JUIN
2021**

Recommandation
Temporaire
d'Utilisation (RTU)
pour le Truvada®

Extension
d'Autorisation de
Mise sur le Marché
pour la PrEP

Arrivée des
génériques

Primo prescription
par tout·e médecin


Prévention diversifiée

les différents outils

- . Dépistage
- . Test and treat, treatment as prevention (TasP)
- . PEP (post-exposure prophylaxis)
- . PrEP (pre-exposure prophylaxis)
- . RdR



-
- Protection individuelle
 - Santé publique : Promotion de la santé sexuelle
+ Réduction de l'incidence du virus



Pour qui ?

- **Recommandée chez tous·tes les adultes et adolescent·es de plus de 15 ans fortement exposé·es au VIH (multipartenariat et partenaire concomittant, originaire d'un pays de forte endémie (Afrique subsaharienne, Caraïbes, Amérique du sud +++), usager·ère de produits psychoactifs, atcd de TPE ou IST dans l'année, pas d'utilisation systématique de préservatifs, travailleur·e·s du sexe, sexe transactionnel)**
- **Elle doit être proposée chez tous·tes les personne de 15 ans et + chez qui elle serait bénéfique (recommandations HAS 2021)**

Sauf si


- Statut VIH inconnu +++
 - rechercher des signes de primo infection
 - date du dernier RSNP : risque de séroconversion en cours si on est dans la fenêtre sérologique
- DFG < 60ml/min chez l'adulte ou < 90ml/min chez l'adolescent·e
- Hypersensibilité à l'un des principes actifs ou excipients du produits

Pour qui ?

Situation particulière : prescription possible chez

- femme avec contraceptif
- enceinte ou allaitante (parcours de soins coordonné)
- porteur VHB mais en prise continue
- adolescent de 15 ans et +

Couple sérodifférents : la PrEP n'est pas nécessaire si partenaire suivi·e sous antirétroviraux avec une charge virale indétectable depuis plus de 6 mois.



Comment



**EN
CONTINU**

**A LA
DEMANDE**



**EN
CONTINU**


HOMME CIS

Début :

2 comprimés en 1 prise

24h-2h avant le rapport à protéger

1 comprimé
tous les jours à la même heure




Arrêt :

2 comprimés après le dernier rapport à protéger

PERSONNE TRANS FEMME CIS

Début :
1 comprimé par jour, 7 jours
avant le rapport à protéger



Arrêt :
1 comprimé par jour, 7 jours
après le dernier rapport à protéger




**A LA
DEMANDE**


Début :

2 comprimés en 1 prise

24h-2h avant le rapport à protéger



1 comprimé 24h après la 1ère prise +/-2h et 48h après +/- 2h



Arrêt : 2 prises après le dernier rapport à protéger



VHB : prise en continu uniquement

OUBLI

Que faire en cas d'oubli ?

PrEP ALD : délai d'oubli de 2 heures

Si oubli < 2h : prenez le médicament et prenez les médicaments suivant à l'heure habituelle

Si oubli > 2h : TPE (si rapport à risque après l'avant dernière prise)

OUBLI

Que faire en cas d'oubli ?

PrEP en continu Homme CIS

délai d'oubli de 2 heures la 1ère semaine puis

délai d'oubli de 12h

si nombre de prise la semaine avant $\geq 4/7$: ok

sinon TPE

si non respect des 2 jours de prises après RSNP : TPE

OUBLI

Que faire en cas d'oubli ?

PrEP en continu Personne Trans et Femme CLS
délai d'oubli de 2 heures la 1ère semaine puis
délai d'oubli de 12h

si nombre de prise la semaine avant $< 6/7$: ok
sinon TPE

si non respect des 7 jours de prises après RSNP : TPE


1^{ère} consult et SUIVI

Poser indication

Vérifier des contre indications et interactions

Vaccinations

Dépistage complet dont créat et séro VIH



1^{ère} consult et SUIVI

Prescription possible dès la 1^{ère} consultation si :

**Sérologie VIH < 7 jours (absence de RSNP 6 semaines)
sinon CV VIH (absence de RSNP 14 jours)**

Clairance de la créatinine < 7 jours (> 60 ans, 90 chez les adolescent·e·s)

Absence de symptômes d'une primo infection VIH

Statut par rapport au VHB connu

Si RSNP dans les 48h : orienter pour un TPE

Avant prescription	Créat DFG Séro VIH CT/NG/TPHA VDRL ALAT / Séro VHC VHB (VHA)	Poser indication Vérification des contre indications et interactions Vaccinations
1 mois	Créat DFG Séro VIH	
4 mois	Créat DFG Séro VIH CT/NG/TPHA VDRL ALAT	
/ 3 mois	Séro VIH CT/NG/TPHA VDRL ALAT	Créat / DFG = / 6 mois si DFG < 90 / comorbidités rénales / > 55 ans / 3 mois si DFG < 70
/ 1 an	Séro VHC Créat / DFG Protéinurie / créatininurie sur échantillon	Séro VHC plus fréquente = USD dont à visée sexuelle (chemsex), Pratiques traumatiques (FIST)
Observance Tolérance Signes cliniques d'IST ou PI Prévention diversifiée		

Avant prescription	Créat DFG Séro VIH CT/NG/TPHA VDRL ALAT / Séro VHC VHB (VHA)	Poser indication Vérification des contre indications et interactions Vaccinations
1 mois	Créat DFG Séro VIH	
4 mois	Créat DFG	Surveillance Tolérance Signes cliniques d'IST ou PI Prévention diversifiée
/ 3 mois		Créat / DFG = • / 6 mois si DFG < 90 / comorbidités rénales / > 55 ans • / 3 mois si DFG < 70
/ 1 an	Séro VHC Créat / DFG Protéinurie / créatininurie sur échantillon	Séro VHC plus fréquente = USD dont à visée sexuelle (chemsex), Pratiques traumatiques (FIST)

SI SUSPICION PRIMO INFECTION VIH : CHARGE VIRALE

EFFETS SECONDAIRES

- Généralement bien tolérée
- Digestifs : nausées, diarrhées, douleurs abdominales
- Céphalées
- Disparaissent au bout de quelques semaines

INTERACTIONS

On vérifie les interactions médicamenteuses sur <https://hiv-druginteractions.org/> ou sur <https://actions-traitements.org/reglette/>
On évite de prendre d'autres médicaments néphrotoxiques en parallèle comme AINS, antibiotiques (vancomycine, aminosides), antifongique (amphotericine B), pentamidine
On évite les compléments à base de protéines / créatinine
On évite les pansements gastriques, charbon actif et psyllium dans les 2heures avant la prep

CONSEILS

Au cours d'une collation
Si vomissement dans l'heure : on reprend

Altération rénale :

- Rechercher pathologie sous jacente ?
- Prise de médicaments néphrotoxiques ?
- Surveillance rénale DFG < 60 ou baisse inexpliquée : controle à J7 + Iono
Phosphore Glycémie Glycosurie Protéinurie Phosphaturie créatininurie pour calcul du taux de réabsorption du phosphore
- Interrompre la prep si toujours DFG < 60 ou autres signes de néphrotoxicité

LIENS UTILES

APPLICATIONS :

AT PREP

MEDISAFE

MY PREP

APPLICATION IPHONE

CEGIDD LE PLUS PROCHE :

WWW.SIDA-INFO-SERVICE.ORG/ANNUAIRE

TPE :

POUR CONNAÎTRE L'ADRESSE DU SERVICE
COMPÉTENT LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS,
CONTAC- TEZ SIDA INFO SERVICE 24H/24 AU 0
800 840 800 OU SUR SIDA-INFO-SERVICE.ORG.

Prep en France :

- [Prep'Dial](#)
- [Prep-info.fr](#)
- [Sida Info Service](#)
- [Sexosafe.fr](#)
- [Seronet.info](#)
- [Vih.org](#)
- [Guide Prep Aides / Guide Prep ENISPE](#)

Prep à l'étranger :

- [prepwatch.org](#)
- [prepineurope.org](#)

Pour les professionnels de santé :

- [FormaPrEP.org](#)
- [Vihclic.fr](#)